植物分类学报
第19卷 第3期 ACTA PHYTOTAXONOMICA SINICA 1981年8月

铁青树科和使君子科二新变种

林有润
(中国科学院华南植物研究所)

TWO NEW VARIETIES OF OLACACEAE AND COMBRETACEAE FROM CHINA

LING YEOU-RUENN
(*South China Institute of Botany, Academia Sinica*)

麻栗坡青皮木 新变种 图1

Schoepfia jasminodora Sieb. et Zucc. var. **malipoensis** Y. R. Ling, var. nov. (Olacaceae)

Arbor 10—20 m alta, foliis crasse chartaceis, ellipticis vel ovato-ellipticis, subtus nervibus elevatis; fructibus majoribus, oblongis vel ovato-ellipsoideis, 1.6—2 cm longis et 1.3—1.5 cm latis, 3—6 spicato-cymosis, infrutescentiis 4—5 cm longis (fl. non vidi) a var. jasminodora valde distincta.

Yunnan: Malipo, K. M. Feng 22696 (Holotyous, HS*; Isotypus, HK*); K. M. Feng 22211; Guangxi: Shiwanda Shan, C. L. Tso, 23528; S. C. Cheng, 5116; Lingyun, S. K. Liou, 28434.

与青皮木(原变种)的区别在于本变种为大乔木,高10—20米;叶厚纸质,椭圆形或卵状椭圆形,背面叶脉凸起。果大,长圆形或卵状椭圆形,长1.6—2厘米,直径1.3—1.5厘米,果3—6枚密集成穗状式的聚伞果序,果序长4—5厘米。花未见。

云南: 麻栗坡,老君山,山谷,海拔1800米,杂木林下。冯国楣22696(主模式标本,存本所HS;同号模式标本存中国科学院昆明植物研究所);冯国楣22211;广西: 十万大山,左景烈23528,陈少卿5116;凌云,刘心炘28434。

原变种为小乔木或灌木,叶薄纸质或纸质,背面叶脉不凸起。果小,长0.7—1(—1.2)厘米,直径0.4—0.5(—0.7)厘米。

崖县风车子 新变种 图2

Combretum olivaeforme A.C. Chao var. **yaxianense** Y.R. Ling, var. nov. (Combretaceae)

A var. *olivaeformi* infrutescentiis terminalibus di-trichotomoso-paniculatis, fructibus ambitu globosis 1.8—2.5 cm diam., sessilibus ad apicem pedunculorum ultimorum in ca-

* HS——Herb. South China Inst. Bot. Acad. Sin.
HK——Herb. Inst. Bot. Kunming Acad. Sin.

图 1　**麻栗坡青皮木 Schoepfia jasminodora** sieb. et Zucc. var. **malipoensis** Y.R. Ling.（邓晶发绘）



图 2　**崖县风车子 Combretum olivaeforme** A.C. Chao var. **yaxianense** Y.R. Ling

1.果序枝；2.叶背一部分放大(示鳞片)。（余峰绘）

pitulam congestis differt. (fl. non vidi).

Guangdong: Hainan, Ya Xian, C. Wang 33616 (Holotypus! HS); Guangxi: Longzhou, S. C. Cheng 13896.

与榄形风车子（原变种）的区别在于本变种为顶生二或三歧聚伞式圆锥果序，果的轮廓为圆球形，包括翅的直径 1.8—2.5，在果序分枝顶端密集成头状。花未见。

广东：海南岛崖县，黄成 33616（主模式标本，存本所）；广西：龙州，陈少卿 13896。

原变种花排成头状花序或近于头状花序并再组成顶生或腋生的圆锥花序。果的轮廓为橄榄形(纺锤形)或长圆形，长 2.5—3.5 厘米，包括翅的直径 0.8—2.5 厘米。